

Describen cómo evolucionaron las rayas para desarrollar aletas en forma de alas

Un estudio del CSIC revela el mecanismo genético que explica la icónica forma de las aletas de estos peces. Las rayas son organismos muy relevantes para comprender la evolución de los rasgos que nos hicieron humanos, como las extremidades

SINC

13/4/2023 10:35 CEST



Tinción de una raya en la que se observa sus cartílagos (azul) y sus huesos (rojo). / David Gold Lynn Kee y Meghan Morrissey

El baile de una raya en el fondo del océano es elegante: **sus enormes aletas frontales se agitan como alas mientras se desliza bajo la arena.** Precisamente, la causa genética que se encuentra detrás de la forma de sus aletas ha sido el objeto del estudio desarrollado por investigadores del CSIC en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), en Sevilla, y en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRBB).

Los resultados, publicados en la revista *Nature*, confirman que **las alteraciones de las estructuras tridimensionales** que forma el ADN al plegarse sobre sí mismo, conocidas como dominios topológicamente asociados (TAD, por sus siglas en inglés), **determinan los genes que se**

activan y desactivan en un momento determinado de la evolución.

Los cambios en las estructuras
tridimensionales del ADN determinan qué
genes se activa y desactivan en la evolución

Los investigadores señalan que **los cambios genómicos que alteran los TADs pueden ser un motor de evolución**. Hasta hace poco, el estudio de la evolución del genoma se centraba principalmente en **las regiones codificantes**, es decir, en aquellas partes que contienen los genes que dan lugar a las proteínas. Sin embargo, este nuevo estudio se centra en el papel de los TADs y de las regiones no codificantes.

“Esta es una nueva forma de entender cómo evolucionan los genomas”, comenta **Darío Lupiáñez**, genetista del Centro Max Delbrück de Medicina Molecular (Alemania) y uno de los autores principales del estudio.

Hace más de 450 millones de años, el genoma de un pez primitivo, el ancestro de todos los animales vertebrados, se duplicó dos veces. La expansión del material genético impulsó **la rápida evolución de más de 60.000 vertebrados**, incluidos los humanos. Uno de nuestros parientes vertebrados más lejanos son las rayas, unos organismos muy relevantes para **comprender la evolución de los rasgos que nos hicieron humanos**, como las extremidades.

Las rayas son uno de los parientes
vertebrados más lejanos de los
humanos

Para ello, los investigadores han estudiado un tipo de raya (*Leucoraja erinacea*) que, debido a la similitud de esta especie con los vertebrados

ancestrales, “permite comparar sus características con las de otras especies para determinar **qué es novedoso y qué es ancestral durante la evolución**”, explica **Christina Paliou**, bióloga del CABD y una de las primeras autoras.

Un momento crucial para la genómica evolutiva

En 2017, el fallecido investigador del CABD **José Luis Gómez-Skarmeta**, figura esencial en la genómica evolutiva, reunió a científicos de todo el mundo para estudiar la evolución de la raya. Su interés era investigar **cómo los genomas evolucionan estructural y funcionalmente** para promover la aparición de nuevos rasgos.

Aquel momento fue crucial para el campo de la genómica evolutiva. Los científicos obtuvieron una visión completamente nueva sobre cómo el ADN de cada célula, que llega a medir hasta dos metros, **se pliega en un núcleo celular de sólo 0,005 centímetros de diámetro**. Estos nuevos estudios demostraron que el empaquetamiento del ADN en el núcleo está lejos de ser aleatorio, sino que se organiza en estructuras 3D llamadas TADs, que contienen genes y sus secuencias reguladoras.

“ *Estas estructuras aseguran que los genes apropiados se activen y desactiven en un momento determinado*

Juan Tena, coautor principal

”

“Estas estructuras 3D aseguran que los genes apropiados se activen y desactiven en un momento determinado, en las células adecuadas”, explica el **Juan Tena**, uno de los autores principales del estudio.

Rafael Acemel, genetista del centro Max Delbrück y uno de los primeros autores, realizó experimentos utilizando **la tecnología Hi-C**, para así dilucidar la estructura 3D de los TADs. Pero interpretar los resultados fue un desafío, ya que los científicos necesitaban el genoma completo de la raya como punto de referencia. “En ese momento, la referencia consistía en **miles de pequeñas piezas de secuencia de ADN** que se encontraban completamente desordenadas, lo cual no ayudaba mucho”.

Los investigadores usaron
secuenciación de lectura larga para
describir el genoma completo de la
raya

Para superar esta dificultad, los científicos utilizaron tecnología de **secuenciación de lectura larga**, junto con los datos de Hi-C, para ensamblar las piezas del ADN como un rompecabezas y asignar las secuencias desordenadas a los cromosomas de la raya. Con esta nueva referencia, reconstruir la estructura 3D de los TAD resultó finalmente posible.

Con este nuevo genoma pudieron establecer **comparaciones con los genomas de los parientes más cercanos**, los tiburones, para así identificar TADs alterados durante la evolución de las rayas. Estos TAD alterados incluían genes de **la vía Wnt/PCP**, que es importante para el desarrollo de las aletas. También identificaron una variación específica en una secuencia no codificante cerca de los genes Hox, que también regulan el desarrollo de las aletas.

“Esta secuencia específica **puede activar varios genes Hox** en la parte frontal de las aletas de la raya, lo que no sucede en otros peces o animales tetrápodos”, señala Paliou. Posteriormente, los científicos realizaron experimentos funcionales que confirmaron que **estos cambios moleculares contribuyeron a la evolución** de la característica forma de la aleta de las rayas.

Los TADs impulsan la evolución

Estudios previos habían demostrado que cambios en los TADs pueden afectar a la expresión de genes y causar enfermedad. En este nuevo estudio, los científicos demuestran que **los TADs también están involucrados en la evolución de rasgos en ciertas especies**.

“ *La estructura 3D del genoma influye en su evolución*
Darío Lupiáñez, genetista molecular y autor del estudio

”

Los TADs son importantes para la regulación de genes, ya que el 40 % de ellos **se conservan en todos los vertebrados**, mientras que el 60 % restante ha evolucionado de una u otra forma. Este mecanismo de evolución podría ser relativamente frecuente y explicar muchos otros rasgos interesantes de especies que observamos en la naturaleza.

"Este es un hallazgo importante, ya que sugiere que la estructura 3D del genoma influye en su evolución", concluye Lupiáñez.

Referencia:

Marlétaz, F. et al. "The little skate genome and the evolutionary emergence of wing-like fin appendages". *Nature* (2023)

Derechos: **Creative Commons**.

TAGS

EVOLUCIÓN

RAYAS

TIBURONES

GENOMA

Creative Commons 4.0

Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. [Lee las condiciones de nuestra licencia](#)