

Revelan la estructura de la proteína responsable de la enfermedad de Huntington

Un trabajo científico en el que participan investigadores del CSIC aporta nuevas claves sobre el papel de la huntingtina en la formación de agregados proteicos tóxicos en el cerebro de las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa rara.

SINC

20/4/2023 11:13 CEST



Ramon Crehuet, investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC). / CSIC / Alejandro Rodríguez.

Un equipo con participación de investigadores del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado la estructura de la **proteína** responsable de la **enfermedad de Huntington**, una patología **neurodegenerativa** grave que se caracteriza por el trastorno progresivo del movimiento y la función cognitiva.

Los resultados del trabajo, publicado en la revista *Nature Structural and Molecular Biology*, allanan el camino hacia una mejor comprensión de la enfermedad, ya que aporta nuevas claves sobre el mecanismo que

desencadena la formación de **agregados proteicos** en el **cerebro** de estos pacientes.

La enfermedad de Huntington se desencadena por una **mutación genética** que afecta a la proteína huntingtina. Este defecto se debe a la expansión de los nucleótidos citosina, adenina y guanina, encargados de codificar en el ADN la síntesis de la glutamina, uno de los 20 aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas. Como resultado, se incrementa el número de glutaminas en la proteína, algo que está directamente relacionado con la formación de agregados proteicos en el cerebro.

En España se estima que más de 4.000 personas padecen la enfermedad de Huntington

A pesar de que se desconoce la función de la proteína huntingtina, hasta ahora se sabe que está implicada en el desarrollo neurológico y que es necesario un número mínimo de moléculas del aminoácido glutamina para este desarrollo. Pero hay un umbral de repeticiones de glutaminas en la proteína huntingtina a partir del cual una persona desarrolla la enfermedad. **La población sana tiene entre 17 y 23 glutaminas consecutivas**, pero **por encima de 36** se desarrollan los **síntomas** de la enfermedad.

La enfermedad, considerada rara, afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 habitantes en la mayoría de los países europeos, aunque también existe en el resto del mundo en diferentes proporciones. En España se estima que más de 4.000 personas la padecen, según la Asociación Española Corea de Huntington.

Una nueva perspectiva

“Aunque todavía no están establecidas las bases de la enfermedad, se cree que esas repeticiones adicionales de glutaminas hacen que las proteínas interactúen entre sí y se facilite la formación de precipitados

y acúmulos proteicos, lo que resulta en la **degeneración neuronal** y en síntomas como la pérdida de coordinación y la demencia”, detalla **Ramon Crehuet**, investigador del CSIC en el IQAC y uno de los firmantes del trabajo liderado por **Pau Bernadó**, del Centre de Biologie Structurale de Montpellier (Francia).

El estudio aporta una nueva perspectiva del umbral patológico de la enfermedad, que va más allá de la longitud de la cadena de repeticiones de glutaminas

El científico español indica que “se sabe que la proteína con un determinado número de glutaminas hace más propensa la aparición de la enfermedad, pero seguimos sin entender del todo por qué la estructura de la proteína cambia y se vuelve más tóxica”.

Ahora, los resultados de esta investigación revelan que **no hay ningún cambio cualitativo** entre la **estructura** de la huntingtina con un **número patológico de repeticiones** de glutamina, y la **huntingtina de personas sanas**. Solo hay cambios graduales que se incrementan a medida que aumenta el número de glutaminas.

“Nuestros resultados aportan una nueva perspectiva del **umbral patológico** de la enfermedad que va más allá de la longitud de la cadena de repeticiones de glutaminas. Conocer la estructura de la proteína y el mecanismo de su agregación puede ser el primer paso para diseñar fármacos que ayuden a paliar los síntomas y mejorar la vida de los pacientes”, resalta el investigador del CSIC.

La exploración de la estructura de las proteínas puede abrir nuevas posibilidades para una mejor comprensión de las enfermedades por expansión de tres nucleótidos, entre las que, además de la enfermedad de Huntington, se encuentran la enfermedad de Kennedy, la distrofia miotónica o el Síndrome del X frágil.

REFERENCIA:

Bernadó, P. *et al.* "The structure of pathogenic huntingtin exon1 defines the bases of its aggregation propensity". *Nature Structural & Molecular Biology* (2023)

Derechos: **Creative Commons.**

TAGS

BIOMEDICINA | ENFERMEDADES RARAS | BIOLOGÍA | QUÍMICA |
NEUROCIENCIA |

Creative Commons 4.0

Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. [Lee las condiciones de nuestra licencia](#)